

Les parasites et les maladies



La tique

Comment la reconnaître?

Corps arrondi muni de 4 paires de pattes avec une minuscule tête. Une fois gorgée de sang, elle peut atteindre 0,5 cm.

- présente dans toute l'Europe
- active toute l'année
- peut transmettre des maladies comme:
 - o la borréliose (maladie de Lyme)
 - o la babésiose (piroplasmose)
 - o l'ehrlichiose



Le phlébotome

Comment le reconnaître?

Moucheron de petite taille (2,5-3 mm), vole en silence.

- présent dans les pays méditerranéens
- actif en soirée et la nuit
- peut transmettre la leishmaniose



Le moustique vecteur du ver cardiaque

Comment le reconnaître?

Moustique à longue pattes, surtout actif le soir.

- présent partout dans le monde
- transmet la dirofilariose (surtout en Europe du Sud)



Une protection de longue durée pour le chien et sa famille

- actif contre les tiques, les phlébotomes et les moustiques vecteurs du ver cardiaque
- 1 traitement = 5 à 6 mois de protection
- inodore et résiste à l'eau



INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES: Prévention des infestations par les tiques (*Ixodes ricinus*; *Rhipicephalus sanguineus*) pendant 5 à 6 mois. Prévention de la succion de sang par les phlébotomes (*Phlebotomus perniciosus*) pendant une période de 5 à 6 mois. Prévention des piqures de moustiques adultes (*Culex pipiens pipiens*) pendant 6 mois.

LISEZ ATTENTIVEMENT LA NOTICE. POUR PLUS D'INFORMATIONS, DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE VÉTÉRINAIRE